

Introducción:

✓ En los sistemas productivos de engorde a corral o feedlot, cuando se habla de la eficiencia productiva, se relaciona principalmente con mantener el estatus sanitario de los animales, brindándole confort y bienestar animal, y logrando una productividad relacionada con un correcto aumento diario de peso logrando la mejor eficiencia de conversión alimenticia.

Es por ello que cuando se plantean las estrategias sanitarias preventivas y terapéuticas para realizar en los establecimientos de engorde a corral, se tiene que tener en cuenta varios factores que gravitan en la sanidad.



FACTORES A TENER EN CUENTA AL INGRESO DE ANIMALES AL FEEDLOT



Procedencia
de los
animales

Cantidad
de horas
de viaje

Cambios de
alimentación

Cambios
de hábitat

Grupos
heterogéneos
(destetes anticipados
o precoces)

Condiciones
climáticas
adversas

Todas estas condiciones predisponen a los animales a distintos grados de estrés.
Por lo tanto, el manejo del estrés es condición sine qua non para lograr
el objetivo del sistema de engorde a corral.



Manejar el proceso del estrés y minimizar sus posibles efectos es clave en los momentos de ingreso. Es por esto que se recomienda el uso de **ADAPTADOR MIN** y **ADAPTADOR VIT** al momento de ingresar a los corrales o cuando se realiza la sanidad. Esto potenciará el efecto de las vacunas preventivas como así también posibilitan una mejor adaptación de los animales.





¿Que enfermedades tienen alta incidencia en el destete?

- **Síndrome respiratorio bovino*** (neumonía)
- **Enfermedades clostridiales*** (mancha y gangrena gaseosa)
- **Queratoconjuntivitis infecciosa***
- **Parasitosis interna y externa:**
Prevenir desparasitando al destete.

*prevención con vacunación



¿Como prevenir el síndrome respiratorio bovino?

La recomendación más importante es comenzar a construir la inmunidad de los terneros mientras están al pie de la madre, administrando las vacunas de tal manera que cuando se destetan los animales estén en el pico de inmunidad.



Pico de Inmunidad:

15 - 20 días

después de la segunda dosis

**VACUNACIÓN
AL INGRESO**



la sugerencia es:



**1ra
DOSIS**

**2da DOSIS
a los 21 días**

- Complejo respiratorio bovino: **BIOPOLIGEN® HS / BIOPOLIGEN® AIR / BIOPOLIGEN® Q***
- Enfermedades Clostridiales: **BIOCLOSTRIGEN® J5 2 ML / POLICLOSTRIGEN®**
- Queratoconjuntivitis: **BIOQUERATOGEN® ÓLEO MÁX**
- Leptospirosis: **BIOLEPTOGEN®**

<https://biovademecum.biogenesisbago.com/planes-sanitarios/feedlot> 

*Vacuna combinada que previene el síndrome respiratorio bovino y queratoconjuntivitis.

ANIMALES AL INGRESO

La sanidad se realiza una vez que los animales hayan tenido el descanso correspondiente, y agua y comida, luego del viaje:



Vacunas

- ✓ Primer dosis de **BIOPOLIGEN® HS** o **BIOPOLIGEN®AIR** o **BIOPOLIGEN Q®** + **BIOCLOSTRIGEN® J5 2 ML** y **BIOLEPTOGEN®**
- ✓ En aquellos establecimientos con antecedentes de QIB, o en épocas de primavera-verano, **BIOQUERATOGEN® OLEO MAX** o en casos donde la tropa llegue con animales afectados.
- ✓ Segunda dosis de **BIOPOLIGEN® HS** o **BIOPOLIGEN®AIR** o **BIOPOLIGEN Q®** + **BIOCLOSTRIGEN® J5 2 ML** y **BIOLEPTOGEN®** entre **15 y 21 días luego de la primera dosis**
- ✓ **BIOPOLIGEN Q®** Cada dosis protege contra el síndrome respiratorio bovino y la queratoconjuntivitis.



Antiparasitarios

- ✓ Según diagnóstico y casuística y también la procedencia de los animales, se recomienda desparasitar con **BAGOMECTINA®, FLOK®, PARAXANE® INY.**



- ✓ La aplicación de **ARRASA®** se hace según necesidad, y es una excelente herramienta para el tratamiento de piojos de invierno y mosca de los cuernos en verano.



Minerales y Vitaminas

- ✓ Momento ideal para aplicar **ADAPTADOR® MIN/VIT** al ingreso de los animales al feedlot. Esto reduce el estrés que sufren los terneros en este momento

Antibióticos

- ✓ El uso de antibióticos al ingreso depende de la procedencia de los terneros y estado del rodeo. Para tratamiento puntuales de neumonía se recomienda **MAXITYL® PLATINUM** o **MAXITYL®**. En casos de requerir un segundo tratamiento, rotar el principio activo usando **FLOROXIN®** o **MAXIBIOTIC® LA**. Siempre se recomienda la aplicación conjunta con un AINES como **KETOPROFENO**, para mejorar el efecto del antibiótico.



IMPORTANTE: este es un plan sanitario sugerido para Sanidad en feedlot. Consultar con su Asesor Veterinario.